

◎4月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「やや高め」・底層「かなり高め」、塩分：表層「やや高め」・底層「やや高め」、透明度：「平年並み」

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
シャコ	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	1
シタ類	多い ↑	同程度 ＝	同程度 ＝	2
ヒラメ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	3
マコガレイ	同程度 ＝	増加 ↑	増加 ↑	4
ネズッコ類	多い ↑	同程度 ＝	増加 ↑	5
メイタガレイ	多い ↑	同程度 ＝	減少 ↓	6
マゴチ	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	7
ガザミ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	8

※アカガイ・トリガイは麻痺性貝毒が検出されたため、2月22日より出荷の自主規制を行っています。

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値

● 平成31年

◆ 平成30年

▲ 平成29年

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
スズキ	同程度 ＝	増加 ↑	同程度 ＝	9
カワハギ類	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	10
マダイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	11
コノシロ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	12
アジ類	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	13
コウイカ類	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	14

板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
ヒラメ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	15
マダイ	同程度 ＝	同程度 ＝	増加 ↑	16
メイタガレイ	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	17
コウイカ類	同程度 ＝	同程度 ＝	同程度 ＝	18

図 9




図 10




図 11




図 12




図 13




図 14




図 15




図 16




図 17





図 18



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 平成31年 ◆ 平成30年 ▲ 平成29年