

◎10月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層・「やや高め」・底層「平年並み」、塩分：表層「平年並み」・底層「やや低め」、透明度：「平年並み」

●巾着網

- マイワシは平年値を大きく上回る漁獲であった（図1）
- カタクチイワシは平年値を大きく下回る漁獲であった（図2）

●小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
シタ類	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	3
ヒラメ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	4
ガザミ	少ない ↓	減少 ↓	同程度 ＝	5
アカガイ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	6
クマエビ	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	7
小エビ類	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7




図8




図1、2は月漁獲量（トン）を示し、その他の図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値 ● 令和元年 ◆ 平成30年 ▲ 平成29年

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
マサバ	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	9
タチウオ	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	10
クロダイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	11
カワハギ類	少ない ↓	同程度 ＝	増加 ↑	12
マナガツオ	少ない ↓	増加 ↑	同程度 ＝	13
コウイカ類	同程度 ＝	同程度 ＝	増加 ↑	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
マダイ	少ない ↓	同程度 ＝	減少 ↓	15
イボダイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	16
ハモ	多い ↑	同程度 ＝	減少 ↓	17
ジンドウイカ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	18

図15




図16




図17





図18



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値

● 令和元年

◆ 平成30年

▲ 平成29年