

◎ 3月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「平年並み」・底層「やや高め」、塩分：表層「やや高め」・底層「平年並み」、透明度：「かなり高め」

● 巾着網（中部標本船の月漁獲量（トン））

○カタクチイワシは平年並みの漁獲量であった（図1）

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
ヒラメ	多い ↑	同程度 ＝	減少 ↓	2
メイタガレイ	少ない ↓	増加 ↑	減少 ↓	3
オニオコゼ	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	4
ガザミ	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	5
シャコ	少ない ↓	減少 ↓	同程度 ＝	6
小エビ類	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	7
トリガイ	多い ↑	減少 ↓	同程度 ＝	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7




図8




図1は漁獲量（トン）を示し、その他図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値 ● 2024年 ◆ 2023年 ▲ 2022年
※2010年から2019年の平均値

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
イワシ類	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	9
アジ類	同程度 ＝	増加 ↑	同程度 ＝	10
マダイ	同程度 ＝	減少 ↓	減少 ↓	11
クロダイ	多い ↑	減少 ↓	減少 ↓	12
タチウオ	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	13
ジンドウイカ類（ひいか）	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
アジ類	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	15
マダイ	多い ↑	減少 ↓	同程度 ＝	16
ウマヅラハギ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	17
コウイカ類	少ない ↓	増加 ↑	同程度 ＝	18

図15




図16




図17





図18



図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

平年値
 2024年
 2023年
 2022年

※2010年から2019年の平均値